

卡介苗接種之衛生教育指導

2002/8/31 修訂(嬰 1)2005/2/28 修訂 2007/6/15 檢閱 2009/2 修訂

✚ 接種目的

預防重於治療，接種卡介苗可以預防肺結核(俗稱肺癆)。嬰幼兒的抵抗力最弱，受結核感染則易發生急性肺結核(結核性腦膜炎)而危及生命。

✚ 接種部位：左上上臂。



✚ 卡介苗接後的正常反應：

- ✚ 在接種後 7-14 天內，注射部位呈現一個小紅結節；此後逐漸長大，微有痛癢，但是不會發燒。
- ✚ 4-6 週，會變成膿泡或潰爛，這是正常反應，此時不必擦藥或包紮，保持清潔即可；如有膿流出，可用無菌紗布或棉花棒擦拭清潔。
- ✚ 平均 2~3 個月，自然會癒合結痂，留有一個微紅色小疤痕。

✚ 注意事項

- ✚ 嬰兒接種卡介苗後，在同側腋窩偶有淋巴腺稍微脹大的現象，並不要緊，會自行消失。如果超過 3 個月尚有腋下淋巴腺腫大情形，請到醫院診療。
- ✚ 出生 24 小時後可以注射卡介苗，體重不足 2.5 公斤不予以注射，出院後體重滿 2.5 公斤，再回本院健兒門診注射。
- ✚ 本院注射時間是：每週星期二、四、五，下午 2:00~4:00（因針劑開瓶後，需在 2 小時內用完，故有時間限制），不須掛號，只要帶寶寶及寶寶的健康手冊及健保 IC 卡到門診三樓填寫資料即可。