

氣切造口護理指導衛教單張

2004.09.15 制定(內 50)2005.02.28 一修

2006.01.04 二修、2006.06.01 三修

2006.12.01 四修、2009/01/12 修訂

2011/10/18 修訂

目的：清潔、消毒氣切傷口，預防感染發生;避免分泌物阻塞氣切管，維持呼吸道通暢。

用物準備：


無菌生理食鹽水 1 瓶、優碘藥水 1 瓶、3% 雙氧水 1 瓶、無菌棉棒 1 包、無菌 Y 紗 1 包、清潔手套、剪刀 1 把、3M 紙膠、無菌氣管內管 1 個、氣切固定帶 1 條、清潔刷 1 支、氣切罩、無菌蒸餾水 1 瓶(或煮沸之開水)、換藥碗 1 個。

技術操作：

- 1.洗手、依需要先準備好用物，視病人情況，需要者先予以抽痰。
- 2.讓病人平躺，頸部採伸直之姿勢。
- 3.戴上清潔手套後，先取下 Y 形紗布，觀察氣切傷口及周圍皮膚狀況，若有發紅、腫脹及異常分泌物的狀況應通知醫護人員(每天至少每執行一次，若 Y 形紗布濕了或髒了應隨時更換)。
- 4.以生理食鹽水棉棒清潔氣切傷口，由內往外環型擦拭，必須將氣切傷口周圍之分泌物清潔乾淨;再以優碘棉棒擦拭氣切傷口周圍，待優碘停留 30 秒後，再以生理食鹽水棉棒將優碘擦拭乾淨。
- 5.以 Y 型紗布覆蓋氣切傷口，將氣切罩蓋在氣切傷口上，以防異物飛

入。

6.傷口護理執行完畢後記得再次洗手。

 **注意事項：**

1. 翻身或移動病人時，要注意避免氣切造口移位或滑脫。
2. 每天注意觀察痰液的量、性質及顏色變化，如有異常狀況請通知醫護人員。
3. 家中建議備甦醒球，若有氣切管滑脫時，請立即打 119 求救，可以甦醒球擠壓通氣並給予高濃度氧氣使用，待救護人員到達。

羅東聖母醫院 敬祝健康