

## 葡萄胎行刮除手術後之出院衛生教育指導

2002/09/30 修訂 2005/2/28 修訂 2007/6/15 檢閱 2009/2 檢閱/2011/10 檢閱

- ✚ 避免在一年之內懷孕。
  
- ✚ 有進行性症狀告知醫師：
  - ✚ 不正常陰道出血(大量或間歇性的)。
  - ✚ 咳嗽或咳血。
  - ✚ 頭痛、噁心、嘔吐、煩燥、頭暈。
  - ✚ 兩次月經間出現異味的陰道分泌物。
  - ✚ 高血壓 (血壓 > 160/90 mm Hg)。
  - ✚ 呼吸急促、不舒適。
  - ✚ 體重急速下降 (一個月內 ↓ 2-3 kg)。
- ◎ 上述各個症狀皆有轉移的可能，應多注意，以期達到早期發現，早期治療的目的。
  
- ✚ 葡萄胎之一般症狀：
  - ✚ 腹部快速增大超過懷孕月數。
  - ✚ 突然的陰道出血，懷孕前 2-3 個月會間歇性或持續性陰道出血。
  - ✚ 水泡狀物體由陰道排出。
  - ✚ 下腹悶痛。
  - ✚ 感覺不到胎動。
  - ✚ 劇烈的嘔吐。
  - ✚ 高血壓 (平時須定時量血壓) 收縮壓在 150-160 mm Hg，舒張壓在 90-60 mm Hg。
  - ✚ 體重過度下降。
  
- ✚ 繼續門診治療。