

五合一疫苗接種後反應及注意事項之衛生教育指導

2002/9/23 修訂 (門 13) 2005/2/28 修訂

2006/6/15 修訂 2008/08/20 修訂

- ✚ 接種以後局部常有紅、腫、熱、痛的現象，請於二十四小時內給予冰敷，隔二十四小時後給予熱敷，每天二至三次，每次五分鐘。
- ✚ 全身性反應有：二至三天內可能會有輕度發燒、啼哭、食慾不振等。
- ✚ 接種後請多喝開水，多休息，如有特殊反應（如發燒等），請回院診治。

羅東聖母醫院 敬祝健康

五合一疫苗接種後反應及注意事項之衛生教育指導

病歷號碼：_____ 姓名：_____

於下述就醫日期至羅東聖母醫院就診，屆時領取衛生教育指導單張，經醫師或護理人員說明解釋業已瞭解。

衛教日期	家屬或病患簽名	指導者簽名	指導方式	指導評值
填表	指導方式代號說明（可複選）		講述→T1；衛教資料→T2；衛教光碟；示教→T4。	
說明	指導評值代號說明	完全錯誤或不會→R1；正確說出部份內容→R2；能完全正確說出內容→R3；能正確執行部份技術→R4；能完全正確執行部份技術→R5。		