

## 卡介苗接種之衛生教育指導

2002/8/31 修訂 (兒 12) 2005/2/28 修訂

2006/6/15 檢閱 2009/01/13 修訂

### ✚ 接種目的

預防重於治療，接種卡介苗可以預防肺結核(俗稱肺癆)。嬰幼兒的抵抗力最弱，受結核感染則易發生急性肺結核(結核性腦膜炎)而危及生命。

### ✚ 接種部位:左手上臂。

### ✚ 卡介苗接種後的正常反應：

- ✚ 在接種後 7~14 天內，注射部位呈現一個小紅結節。
- ✚ 此後逐漸長大，微有痛癢，但是不會發燒。
- ✚ 4~6 週，會變成膿泡或潰爛，此時不必擦藥或包紮，保持清潔。
- ✚ 如有膿流出，可用無菌紗布或棉花棒擦拭清潔。
- ✚ 平均 2~3 個月自然會癒合結痂，留有一個微紅色小疤痕。

### ✚ 注意事項

- ✚ 嬰兒接種卡介苗後，在同側腋窩偶有淋巴腺稍微脹大的現象，並不要緊，會自行消失。如果超過 3 個月尚有腋下淋巴腺腫大情形，請到結核病防治院、防治所或衛生所、醫療院所診療。
- ✚ 出生 24 小時後可以注射，體重不足 2.5 公斤不予以注射，出院後體重滿 2.5 公斤再回本院健兒門診注射，
- ✚ 注射時間是:每週星期五下午 2:00~4:00，不須掛號，只要帶寶寶及寶寶的健康手冊到門診三樓填寫資料即可。

羅東聖母醫院 敬祝健康